

令和8年度 季節性インフルエンザ 予防接種委託医療機関一覧



☆当日は予診票、母子健康手帳を忘れずにご持参ください。


■八幡平市内の医療機関

医療機関名	実施曜日	受付時間		電話番号
八幡平市立病院 (小児科)	月・水・金	午後2時30分～3時	※必ず事前に予約をしてください。	0195-76-3111
	木	午後2時～3時		
八幡平中央整形外科 ・内科クリニック	月・火・木・金	午前8時45分～11時30分 午後2時15分～5時30分	※診療時間等に変更がある場合がございますので、ホームページをご確認のうえ来院ください。	0195-76-2318
	水・土	午前8時45分～11時30分		
吉田内科呼吸器科医院	月・火・木・金	午前8時30分～11時15分 午後2時～5時		0195-70-1100
	水・土	午前8時30分～11時30分		
エールクリニック八幡平	月・火	午前8時30分～12時 午後1時30分～5時	※経鼻生ワクチン（フルミスト）を接種希望の方は、1週間前までに電話又はWEBにてご予約ください。	0195-75-2355
	水・木	午前8時30分～12時		
東八幡平病院	水（祝日を除く）	午後1時～1時30分	※1週間前までに予約が必要です。	0195-78-2511
八幡平市立安代診療所	月～金	午前8時30分～11時	※事前に予約をしてください。 ※未就学児の予防接種は行っていません。	0195-72-3115
八幡平市立田山診療所	月・火・水・金	午後1時30分～3時30分	※事前に予約をしてください。 ※未就学児の予防接種は行っていません。	0195-73-2126

■八幡平市以外の医療機関

医療機関名	実施曜日	受付時間		電話番号
さいとう小児科クリニック	月・火・水・金	午前8時30分～11時30分 午後2時30分～6時	※要予約 ※母子健康手帳とインフルエンザ予診票を必ずお持ちください。	019-643-7171 ・インターネットから予約可
	木・土	午前8時30分～12時		
西島こどもクリニック	月・火・水	午後2時～2時30分	※一般診療時間内も受け付けております。必ず事前に代表電話にお電話ください。	019-651-1369
山口クリニック	月・火	午前8時45分～11時 午後2時45分～5時	※注射ワクチン接種を希望される場合は事前の予約は不要です。 ※経鼻ワクチン接種を希望される場合は必ず事前にワクチンの予約をしてください。 ※接種当日はインターネットで診察予約をお願いします。	019-641-6818
	水・金	午前8時45分～11時 午後1時45分～4時		
	土	午前8時45分～11時		
巣子こどもクリニック	月・火・木・金	午前9時～11時30分 午後2時～4時30分	※接種する前日までに、電話または窓口で予約可能です。	019-681-7217
	土	午前9時～11時30分		
盛岡さくらクリニック	月・火・木・金	午前9時30分～11時 午後2時30分～5時	※経鼻ワクチン接種を希望される場合は必ずご予約ください。 ※母子健康手帳・身分証明書・お薬手帳をお持ちください。 ※ホームページをご確認ください。	019-645-3939
	水・土	午前9時30分～11時		
ほそかわ小児科クリニック	月・水・木・金	午前9時～11時 午後2時～5時	※ 接種当日 にインターネットにて予約してください。 ※来院前に一度ホームページを確認ください。 ※母子健康手帳と予診票を必ずお持ちください。	0195-26-8100
	火・土	午前9時～11時		

★委託医療機関ではない所で予防接種する場合は・・・
接種を受ける前に、予防接種実施依頼書の申請が必要です。
母子健康手帳を持参のうえ、市役所健康こども課で手続きしてください。



【お問い合わせ先】八幡平市 福祉部 健康こども課健康推進係 ☎ 0195-74-2111

季節性インフルエンザ予防接種 説明書

1 どんな病気？

インフルエンザは、インフルエンザウイルスによる急性の呼吸器感染症です。

感染すると、発熱・頭痛・全身のだるさ・筋肉や関節の痛みなどがみられ、その後、鼻水・咳などの呼吸器症状が現れます。いわゆる普通のかぜと比べて、全身症状が強いことが特徴です。

主な感染経路は、咳・くしゃみ・会話などから発生する飛沫による感染です。その他、飛沫の付着物に触れた手や指を介して接触感染もおこります。潜伏期間は1～4日です。

2 ワクチンについて

インフルエンザワクチンは、注射による不活化ワクチンと鼻の中に噴霧する経鼻生ワクチンがあります。どちらのワクチンも、予防効果が期待できるのは、接種が終わってから2週間から5か月程度と考えられています。



副反応

注射の不活化インフルエンザワクチン

接種した場所の赤み・はれ・痛みなど。

全身性の反応としては、発熱・頭痛・寒気・だるさなどがみられます。いずれも、通常は2～3日で軽快します。

経鼻の生インフルエンザワクチン

接種後に鼻水や鼻づまり・のどの痛みや咳・頭痛など。

全身性の反応としては、発熱・下痢・腹痛・疲労など。いずれも、通常は2～3日で軽快します。

3 ワクチンの接種に注意が必要な人

①注射の不活化インフルエンザワクチン

○接種を受けることができない人

- ◇明らかな発熱がある人
- ◇重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- ◇ワクチンの成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある人

○接種を受けるにあたって注意が必要な人

接種前にかかりつけ医によく相談しましょう

- ◇心臓・血管・腎臓・肝臓・血液に持病がある人、発育に障がいがある人
- ◇これまでの予防接種で接種後2日以内に発熱や全身性発疹等のアレルギーを疑う症状があった人
- ◇過去にけいれんを起こしたことがある人
- ◇過去に免疫不全の診断を受けたことがある人
- ◇先天性免疫不全症の病気をもっている近親者がいる人
- ◇間質性肺炎・気管支喘息の呼吸器系の病気がある人
- ◇ワクチンの成分または鶏卵・鶏肉・そのほか鶏由来のものに対してアレルギー反応を起こすおそれのある人

②経鼻の生インフルエンザワクチン

○接種を受けることができない人

- ◇明らかな発熱がある人
- ◇重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- ◇ワクチンの成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある人
- ◇明らかに免疫機能に異常のある疾患がある、または免疫抑制をきたす治療を受けている人
- ◇2歳未満の人

○接種を受けるにあたって注意が必要な人

接種前にかかりつけ医によく相談しましょう

- ◇ゼラチンを含む製剤や食品でアナフィラキシーなどのアレルギーを起こしたことがある人
- ◇心臓・血管・腎臓・肝臓・血液に持病がある人、発育に障がいがある人
- ◇これまで予防接種で接種後2日以内に発熱や全身性発疹等のアレルギーを疑う症状があった人
- ◇過去にけいれんの既往がある人
- ◇過去に免疫不全の診断がなされている人
- ◇先天性免疫不全症の病気をもっている近親者がいる人
- ◇重度の喘息や喘鳴のある人
- ◇ワクチンの成分または鶏卵・鶏肉・そのほか鶏由来のものに対してアレルギー反応を起こすおそれのある人
- ◇妊娠中、または妊娠の可能性のある家族と同居している人